

# 歯周病リスクと疾患の評価 入力用紙

## 作成者

歯周病検査日 年 月 日

## 患者

名前 \_\_\_\_\_ 男・女 \_\_\_\_\_

生年月日 年 月 日

Previser ID \_\_\_\_\_

## 患者履歴と臨床データ

### 歯科来院

- a) 不明
- b) 来院歴なし／初めての来院
- c) 一年に1～2回
- d) 一年に3回以上
- e) 不定期
- f) 救急

### 喫煙歴

- a) 不明
- b) 喫煙歴なし
- c) 喫煙していた
- d) 一日10本未満の喫煙
- e) 一日10本以上の喫煙

### 糖尿病

- a) 不明
- b) 糖尿病でない
- c) 良くコントロールされた糖尿病
- d) まあまあコントロールされた糖尿病
- e) あまりコントロールされていない糖尿病

患者は現在妊娠中

### 口腔衛生

- ポケットに対する歯周外科が行われた
- 分岐部病変
- 縁下マージン修復物
- 垂直性骨欠損
- X線写真で歯石が認められる、または縁下歯石あり

優良：これ以上の改善は望む必要がない  
可：わずかに改善する可能性  
不可：実質的な改善が必要

### 1/6 口腔単位中、最も深いポケット

#### 上顎右側

- a) <5 mm
- b) 5～7 mm
- c) >7 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 上顎前歯部

- a) <5 mm
- b) 5～7 mm
- c) >7 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 上顎左側

- a) <5 mm
- b) 5～7 mm
- c) >7 mm
- d) 歯牙なし

出血

### X線診で CEJ からの骨高さ

#### 上顎右側

- a) <2 mm
- b) 2～4 mm
- c) >4 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 上顎左側

- a) <2 mm
- b) 2～4 mm
- c) >4 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 下顎右側

- a) <5 mm
- b) 5～7 mm
- c) >7 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 下顎前歯部

- a) <5 mm
- b) 5～7 mm
- c) >7 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 下顎左側

- a) <5 mm
- b) 5～7 mm
- c) >7 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 下顎右側

- a) <2 mm
- b) 2～4 mm
- c) >4 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 下顎前歯部

- a) <2 mm
- b) 2～4 mm
- c) >4 mm
- d) 歯牙なし

出血

#### 下顎左側

- a) <2 mm
- b) 2～4 mm
- c) >4 mm
- d) 歯牙なし

出血

各 1/6 口腔単位の中で最深値を入力してください(平均値ではない)